



## LES ROSES.

93

### ROSA RUBIGINOSA

(*Triflora*; voyez ci-après, var. x.).

#### LE ROSIER ROUILLÉ, A TROIS FLEURS.

##### DESCRIPTION.

Ce Rosier, très-commun dans les haies et dans les buissons, s'élève à la hauteur de cinq à six pieds; ses tiges sont munies d'aiguillons nombreux, crochus et inégaux. Les folioles, au nombre de cinq à sept, rudes au toucher, sont couvertes dans leur surface postérieure et en leurs bords, de poils glanduleux, visqueux, souvent roussâtres, exhalant, sur-tout lorsqu'on les froisse dans les doigts, une odeur vineuse assez agréable. Les fleurs, réunies par deux, trois, ou cinq, à l'extrémité des rameaux, sont supportées par des pédoncules hispides. Le tube des calices est ovoïde et glabre; les styles sont velus et peu saillants, enfin les stygmates se réunissent en une tête convexe au centre de la fleur.

*Description spécifique et Nomenclature des variétés de ce Rosier.*

##### R. RUBIGINOSA.

R. *Germinibus ovatis globosis-ve; foliis subrotundis supra pubescentibus subtus margineque glanduloso-villosis; petiolis glandulosis cauleque aculeatis; aculeis substipularibus.* (N.)

\* Tubes des calices et pédoncules hispides.

- a. R. *Rubiginosa vulgaris*. WILLD. *En. Plant. Ber.* 1, pag. 156, var. a.
- R. *Rubiginosa* L. mant. 564. THUILLIER, *Fl. de Paris*, ed. 2, p. 250.
- R. *Rubiginosa hirta*. DESV. *Journ. Bot.* 1813, p. 118, var. x.
- R. (*Eglauteria*). ROSS. Tab. 10. Pédoncules le plus souvent uniflores. Vulg. *Eglautier rouge*, *Eglautier à odeur de pomme de reinette*.
- β. R. *Rubiginosa olivina*. DESV. *l. c.* var. e. Tube petit, oliviforme.
- γ. R. *Rubiginosa Cretica*. R. (*Cretica*) *montana foliis subrotundis glutinosis et villosis*. TOURNEF. *coroll.* 53. *An Rubiginosa sphaerocarpa?* DESV. *l. c.* p. 117, var. γ. Croit dans les îles de la Grèce. L'individu de M. DESV. se trouve sur les Alpes.